

BIJSLUITER
PITUISAN “S” PRO INJ. (OXYTOCIN)
10 I.E./ml, oplossing voor injectie

1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE,

Alfasan Nederland BV
Kuipersweg 9
3449 JA Woerden
Nederland
Tel: 0348416945
Fax: 0348483676

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

PITUISAN “S” PRO INJ. (OXYTOCIN), 10 I.E./ml, oplossing voor injectie
Oxytocine

3. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Per ml:

Werkzaam bestanddeel:

Oxytocine 10,0 I.E.

Hulpstoffen:

Chloorbutanol 2,5 mg/ml

4. INDICATIES

Paard:

- retentio secundinarum;
- preventie van terugkerende uterusprolaps na geslaagde repositie;
- onvoldoende melkejectie.

Rund:

- preventie van terugkerende uterusprolaps na geslaagde repositie;
- onvoldoende melkejectie.

Schaap:

- preventie van terugkerende uterusprolaps na geslaagde repositie;
- onvoldoende melkejectie.

Varken:

- primaire en secundaire weeënzwakte;
- uterusatonie;
- preventie van terugkerende uterusprolaps na geslaagde repositie;
- agalactie.

Geit:

- preventie van terugkerende uterusprolaps na geslaagde repositie;
- onvoldoende melkejectie.

Hond:

- primaire en secundaire weeënzwakte;
- retentio secundinarum;
- preventie van terugkerende uterusprolaps na geslaagde repositie.

Kat:

- primaire en secundaire weeënzwakte;
- retentio secundinarum;
- preventie van terugkerende uterusprolaps na geslaagde repositie.

5. CONTRA-INDICATIES

- Niet ontsloten cervix;
- Verkeerde positie van de vrucht/uterus;
- Obstructieve dystocia.

6. BIJWERKINGEN

Alleen bij overdosering:

- Kortdurende vasodilatatie en bloeddrukval;
- Waterretentie;
- Hyperstimulatio uteri waardoor verlengde en vaak optredende contracties van de uterus. Bij kramptoestand van de uterus kan de zuurstofvoorziening van de vrucht in gevaar worden gebracht.;
- Beïnvloeding van de foetale bloedcirculatie.

Indien uw ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7. DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Paard, rund, schaap, varken, geit, hond en kat.

8. DOSERING VOOR ELKE DIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG

Toedieningsweg:

Intramusculair of subcutaan

Dosering:

- Paard: - 10-50 I.E.
- Rund: - 10-50 I.E.
- Varken: - 20-40 I.E.
- Schaap: - 10-30 I.E.
- Geit: - 10-30 I.E.
- Hond: - 0,5-3 I.E.
- 1-10 I.E. post partum
- Kat: - 0,3-1 I.E.
- 1-3 I.E. post partum

Aangezien de flacon niet vaker dan 22 keer mag worden aangeprikt, dient de gebruiker de meest geschikte flacongrootte te kiezen.

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Geen.

10. WACHTTERMIJN

Melk: nul dagen

(Orgaan)vlees: nul dagen

11. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN BIJ BEWAREN

Bewaren bij 2°C - 8°C (in een koelkast).

Beschermen tegen licht.

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket.

Houdbaarheid na eerste aanprikken flacon: 30 dagen.

12 SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Bij overdosering kunnen de volgende symptomen optreden:

- Kortdurende vasodilatatie en bloeddrukdaling;
- Waterretentie;
- Hyperstimulatio uteri waardoor verlengde en vaak optredende contracties van de uterus. Bij kramptoestand van de uterus kan de zuurstofvoorziening van de vrucht in gevaar worden gebracht.;
- Beïnvloeding van de foetale bloedcirculatie.

Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.

13. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige diergeneesmiddelen verwijderd. Deze maatregelen dienen tevens ter bescherming van het milieu.

14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

28 augustus 2013

15. OVERIGE INFORMATIE

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

REG NL 2113

KANALISATIE

UDA