

# Anabolin "Forte" Pro Inj. 50 mg/ml

## oplossing voor injectie voor hond en kat

### NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE

Alfasan Nederland B.V., Kuipersweg 9, 3449 JA Woerden, Nederland

### BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Anabolin "Forte" Pro Inj, 50 mg/ml oplossing voor injectie voor hond en kat  
Nandrolonefenylpropionaat

### GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Per ml:

#### Werkzaam bestanddeel:

Nandrolonefenylpropionaat 50 mg

#### Hulpstoffen:

Benzyl alcohol

### INDICATIES

- Reconvalenscentie na bacteriële en parasitaire ziekten;
- Uitputting na hoge prestaties;
- Zware partus.

### CONTRA-INDICATIES

Niet gebruiken bij:

- Aanwezigheid van hormoon afhankelijke tumoren zoals mamma- en prostaatcarcinomen;
- Leveraandoeningen.

### BIJWERKINGEN

- virilisatie van de vrucht in de eerste fase van de ontwikkeling van de vrucht met als gevolg gedragsveranderingen in een later stadium;
- remming van de spermatogenese.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

### DOELDIERSOORTEN

Hond en kat

### DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, TOEDIENINGSWEGEN EN WIJZE VAN GEBRUIK

Subcutaan of intramusculair toedienen:

Eenmalig 1 mg nandrolonefenylpropionaat per kg lichaamsgewicht, eventueel herhalen na 3 weken.

### AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

De stop kan tot 22 keer veilig worden aangepikt.

### WACHTTIJDEN

Niet van toepassing.

### BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren. Bewaren beneden 25 °C. Niet in de vriezer bewaren.

Houdbaarheid na aanprikken van de flacon: 30 dagen, indien bewaard bij 2 °C - 8 °C (in een koelkast).

Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP.

### SPECIALE WAARSCHUWINGEN

#### Dracht en lactatie:

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht en/of lactatie. Uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risico beoordeling van de behandelend dierenarts.

#### Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:

Geen gegevens beschikbaar.

#### Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota):

Bij overdosering zijn geen andere bijwerkingen bekend dan die genoemd onder rubriek "Bijwerkingen".

#### Onverenigbaarheden:

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de onverenigbaarheid, moet dit diergeneesmiddel niet met andere diergeneesmiddelen worden vermengd.

### SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUEEL AFVALMATERIAAL

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

### DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

12 januari 2022

### OVERIGE INFORMATIE

1 x 10 ml flacon verpakt in een kartonnen doos.

35 x 10 ml flacon verpakt in een polystyreen buitenverpakking.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

REG NL 4423

### KANALISATIE

UDD

## PACKAGE LEAFLET

# Anabolin "Forte" Pro Inj. 50 mg/mL

solution for injection for dogs and cats

### NAME AND ADDRESS OF THE MARKETING AUTHORISATION HOLDER AND OF THE MANUFACTURING AUTHORISATION HOLDER RESPONSIBLE FOR BATCH RELEASE

Alfasan Nederland B.V., Kuipersweg 9, 3449 JA Woerden, The Netherlands

### NAME OF THE VETERINARY MEDICINAL PRODUCT

Anabolin "Forte" Pro Inj, 50 mg/mL solution for injection for dogs and cats  
Nandrolone phenylpropionate

### STATEMENT OF THE ACTIVE SUBSTANCES AND OTHER INGREDIENTS

Per ml:

#### Active substance:

Nandrolone phenylpropionate 50 mg

#### Excipients:

Benzyl alcohol

### INDICATIONS

- Recovalescence after bacterial and parasitic diseases;
- Exhaustion after high performance;
- Severe partus.

### CONTRAINDICATIONS

Do not use in:

- Presence of hormone-dependent tumours such as mammary and prostate carcinomas;
- Liver diseases.

### ADVERSE REACTIONS

- virilisation of the foetus at the first stage of its development, resulting in changes in behaviour at a later stage;
- inhibition of spermatogenesis.

If you notice any serious adverse events or other reactions not mentioned in this package leaflet, please inform your veterinarian.

### TARGET SPECIES

Dogs and cats

### DOSAGE FOR EACH SPECIES, ROUTES AND METHOD OF ADMINISTRATION

Administer subcutaneously or intramuscularly:

1 mg nandrolone phenylpropionate per kg body weight once, repeat after 3 weeks if necessary.

### ADVICE ON CORRECT ADMINISTRATION

The stopper can be punctured up to 22 times safely.

### WITHDRAWAL PERIOD

Not applicable.

### SPECIAL STORAGE PRECAUTIONS

Keep out of the sight and reach of children. Do not store above 25 °C. Do not freeze.

Shelf life after puncturing the vial: 30 days if stored at 2 °C - 8 °C (in a refrigerator).

Do not use after the expiry date stated on the label following EXP.

### SPECIAL WARNINGS

#### Pregnancy and lactation:

The safety of the veterinary medicinal product has not been established during pregnancy and/or lactation. Use only according to the benefit-risk assessment by the responsible veterinarian.

#### Interaction with other medicinal products and other forms of interaction:

No data available.

#### Overdose (symptoms, emergency procedures, antidotes):

No adverse events other than those mentioned in section "Adverse reactions" are known for overdose.

#### Incompatibilities:

As no compatibility studies have been conducted, this veterinary medicinal product should not be mixed with other veterinary medicinal products.

### SPECIAL PRECAUTIONS FOR THE DISPOSAL OF UNUSED VETERINARY PRODUCT OR WASTE MATERIALS IF ANY

Any unused veterinary medicinal product or waste materials derived from such veterinary medicinal products should be disposed of in accordance with local requirements.

### DATE ON WHICH THE PACKAGE LEAFLET WAS LAST APPROVED

12 January 2022

### OTHER INFORMATION

1 x 10 ml vial packed in a cardboard box.

35 x 10 ml vial packed in a polystyrene outer packaging.

Not all pack sizes may be marketed.

REG NL 4423

UDD status - only to be used by veterinarians.